

Q スイッチルビーレーザー治療の承諾書

起こりうるリスクなど

1度のレーザーでしみや ADM・ほくろが完全に消えるわけではありません。

レーザー後かさぶたが取れた後患部が濃くなることがあります。

これは炎症後色素沈着と言われおよそ50%の確率で生じます。

極めて希なことですが色が抜けてしまうことがあります。

処置について



↑ **リンデロンV軟膏**

↑ **サンホワイト**

しみ・ADMの場合

最初の3日間→1日2回洗顔後**リンデロンV軟膏**を塗りガーゼ、テープで保護します。

4日目以降→1日2回洗顔後**サンホワイト**を塗りガーゼ、テープで保護します。

かさぶたがとれるまでガーゼ、テープの処置を続けてください。

かさぶたが早めに剥がれると炎症後色素沈着が起きるリスクが高くなるので洗顔時などは無理にはがさず患部を優しく洗ってください。

かさぶたが取れた後、朝は日やけ止め、夜はハイドロキノンをお使いください。

★かさぶたが取れない場合は軟膏・ガーゼ処置を1週間程度続けてください。

その後しみは徐々に薄くなっていきます。

ほくろの場合

最初の3日間→1日2回洗顔後**リンデロンV軟膏**を塗りガーゼ、テープで保護します

4日目以降→1日2回洗顔後**サンホワイト**を塗りガーゼ、テープで保護します。

その後創部が安定するまで引き続き1週間程度処置を続けることをお勧めします。

以上を承諾し、レーザー治療を受けます。

日時 年 月 日 氏名