

Qスイッチルビークーレーザー承諾書(ほくろ)

- (1) レーザー直後は数時間ひりひり感が持続しますがすぐにおさまります。当日の夜から軟膏②を使用してください。軟膏は必ず朝と晩の2回外用してください。軟膏の量はべたべたする程度多めにしてください。また塗るときはけっして患部にすりこまずやさしく塗ってください。その後ガーゼをはり、テープで固定してください。
なおどうしても日中ガーゼが出来ない方は専用軟膏(GRAFA キトシールド軟膏 10g 3000円)があるのでお申し出ください。キトシールド軟膏は日焼け止め、皮膚の保護、レーザーによる炎症の軽減の効果があります。
- (2) 数日後には黒いかさぶたができますが引き続き塗り薬を続けてください。
- (3) 約5日間~10日後にかさぶたがとれます。取れましたらその後は日焼け止めに3ヶ月程度はお使ってください。かさぶたがとれない場合も7日間はガーゼ処置を行ってください。
- (4) かさぶたが取れた後はほくろは薄くなっていることがほとんどです。
またもしかさぶたにならない場合でも1カ月程度の間に少しずつほくろは薄くなっていきます。
したがって同じ部位に関しては最低1カ月の間隔をあけてレーザーを照射することになります。

★★★重要★★★

ほくろに対してのQスイッチルビークーレーザーはあくまで薄くするだけです。回数を繰り返すうちに目立たなくなっていくと考えてください。また反応は個人差が大きいのでほとんど変化しないこともあります。また可能性は少ないですが強くレーザーが反応した場合、逆に色が抜けてしまうこともあります

(色素脱失)

平成 年 月 日

氏名