

Qスイッチルビーレーザー承諾書(扁平母斑)

- (1) レーザー直後は数時間ひりひり感が持続しますがすぐにおさまります。当日の夜から軟膏①を最初の5日間外用し軟膏②は6日目から使用してください。軟膏は必ず朝と晩の2回外用してください。軟膏の量はべたべたする程度多めにしてください。また塗るときは必ず患部にすりこまずやさしく塗ってください。その後ガーゼをはり、テープで固定してください。
- なおどうしても日中ガーゼが出来ない方は専用軟膏(GRAFA キトシールド軟膏 10g 3000円)の使用をおすすめします。必要な方は医師、スタッフにお伝えください。
- GRAFA キトシールド軟膏は日焼け止め、皮膚の保護、レーザー後の炎症軽減の効果があります。

*****数日後かさぶたができた場合*****

洗顔時はガーゼをとってもかまいませんが決してこすらないようにしてください。かさぶたは1週間～2週間後にとれることがほとんどです。かさぶたが取れた後朝は低刺激性の日焼け止め、夜はお持ちのハイドロキノンを外用してください。

*****数日後かさぶたができなかった場合*****

ガーゼ保護は7日間程度行ってください。その後朝は低刺激性の日焼け止め、夜はお持ちのハイドロキノンを外用してください。

かさぶたにならなかった場合は少しずつ薄くなっていく場合と一時的に濃くなる場合があります。濃くなった場合もかならず最終的には薄くなっていくのでハイドロキノンや内服治療を続けてください。

- (2) 1ヶ月後程度を目安に再診をしてください。この時点ではレーザーは行いません。

次回のレーザーの予約をお取りいただきます。

★★★重要★★★

扁平母斑に対してQスイッチルビーレーザーを照射した場合、効果は様々です。

1度のレーザーでほぼ消失する方、全く変化しない方、一度薄くなってもすぐに再発する方など様々です。また可能性はまれですが、反応が強く生じれば逆に色がぬけてしまい白くなってしまう可能性もあることを充分にご理解ください。2回目以降レーザーを行う場合もそれまでハイドロキノンや トレチノインの外用、内服治療の継続をおすすめします。これらは扁平母斑自体を薄くするわけではないのですが、皮膚表面のメラニン色素を軽減することによりレーザーの深達性を高め、結果的に レーザーの反応をよくするからです。

平成 年 月 日

氏名