

フォトシルク（光美肌治療）承諾書

この治療は、熱エネルギーを利用し、光老化によるシミ・ソバカスやくすみ、血管拡張による肌の赤み、その他の肌の老化現象を複数回の治療で改善させることを目的とした治療です。回数を重ねることによって少しずつ穏やかに肌質が改善していきます。

光治療前後の日焼けは避け、普段から日焼け止めを使用して下さい。特に治療前日焼けは光治療の効果が強く出現するため厳禁です。なお当日、明らかな日焼けがある場合施術はできません。

可能であれば照射 1 か月前よりビタミン C やトラネキサム酸などの内服や（美肌内服セット：1 か月分 3000 円）ハイドロキノン軟膏（6g：2000 円）を用いることによりよく安全かつ効果的に照射が可能となります。

1. 治療と異なり、ガーゼやテープを貼る必要はありません。直後からお化粧は可能です。
2. 光照射時にゴムではじく程度の刺激があります。骨の出ている部位やシミの多い部分などによっては痛みが増すことがあります。
3. 目に見えているシミやソバカスはもちろん隠れシミなども照射後～数日後に濃く浮き上がってくるものがあります。1～2 週間程度で自然に脱落しますので無理にはがしたりはしないで下さい。かさぶたが取れたあとは、美肌内服セットやハイドロキノン軟膏を継続することにより、シミ、ソバカスの再発や色素沈着の予防になります。また、かさぶたにならなくても回数を重ねることによって徐々に薄くなります。
4. 光治療後は赤みやひりつきが出ますが 1～2 日で消失することがほとんどです。熱いお湯での洗顔やこすりすぎに注意しご自宅ではなるべく低刺激の化粧水、乳液で充分保湿をしてください。
5. 2 回目以降の治療は 3～4 週間後が目安となります。5～6 回をワンクールとしていますが、治療回数は肌質・症状により異なります。ただし、症状によっては改善が困難なものもあります
6. ホクロに反応し、薄くなる場合があります。ホクロへの照射を希望しない場合にはその旨をお伝え下さい。
7. 光治療中はアイシールドにて目を保護させていただきますが、絶対に目を開けないでください。

重要

- ① 日焼けした肌、メラニン色素が多い部分などには予期できず反応が強く出る事があります。場合によっては、軽いやけど・色素沈着・色素脱失になる可能性があります。**2～3 日後に赤みが残っている場合や、水ぶくれが生じた場合は必ず来院して下さい。**すぐに治療を開始します。
- ② **肝斑がある方・潜在的に肝斑がある方（かくれ肝斑）は照射を続けると今より一時的に濃くなる可能性やその誘発の可能性が**あります。照射を中止すると数カ月で元の肌に戻ることは多いですが照射前はもちろん照射後も美肌内服薬セットやハイドロキノン軟膏の継続を強くおすすめします。
8. 完全予約制の為、当日キャンセルは¥3,000、無断キャンセルは¥5,000（税抜）
キャンセル料を頂戴致しますので、必ず前日までにご連絡下さい。

◎貴重品・貴金属類は体から取り外し、ご自分で保管してください。

平成 年 月 日

氏名